


試管嬰兒療程與子宮內膜損傷

在胚胎移植前進行子宮內膜損傷對接受試管嬰兒的女性是否安全有效？

研究背景



一些研究建議，對於進行試管嬰兒療程之婦女，若在胚胎植入子宮之前先對子宮內膜進行刮搔，則著床的機會將會提升。

研究結果

活產率 **影響不明確**
試管嬰兒 = 27%
伴隨子宮內膜損傷 = 27-32%

臨床懷孕率
試管嬰兒 = 32%
伴隨子宮內膜損傷 = 31-37%



幾乎沒有影響

子宮內膜損傷似乎不影響試管嬰兒流產的機率

子宮內膜損傷手術會導致**輕至中度**的疼痛和少量的出血

研究方法

文獻搜尋關於比較**子宮內膜損傷**與**無干預措施**或**假治療**的隨機對照試驗 (RCTs)



研究侷限性

- 樣本數較少(樣本數中數 = 157)
- 由於品質較差和高偏差風險，排除了許多研究的主要分析
- 無法評估出血和疼痛，因為大多數研究僅在干預組中收集這些結果

子宮內膜損傷對女性進行試管嬰兒療程的活產率和臨床懷孕率**影響不明確**
證據**無法支持**子宮內膜損傷作為試管嬰兒療程的常規使用方法